



Avertissement agricole

Boufaroua du palmier dattier

11/05/2022

Le stade phénologique du palmier dattier s'approche du grossissement des fruits dans les régions phoénicoles précoces du sud; stade réceptif aux attaques des acariens dont le premier foyer a été signalé dans les wilayas d'Adrar et de Bachar.



A cet effet, il est recommandé aux phoéniculteurs ayant observé les premières attaques du boufaroua d'entamer immédiatement les traitements par l'application d'un produit acaricide approprié.



Dans les régions non encore infestées, les phoéniculteurs doivent rester vigilants en surveillant de près les régimes de dattes afin de se préparer à une éventuelle intervention par des traitements chimiques dès l'apparition des premiers foyers.

Il est préconisé d'entretenir la palmeraie avant le traitement par l'élimination des débris de palmes et les résidus de récolte.



تنبيهات زراعية

2022/05/11

البوفروة على أشجار النخيل



تتواجد أشجار النخيل في المناطق الجنوبية المعروفة بزراعة النخيل المبكرة في طور " تضخم الثمار": طور قابل للإصابة بمرض البوفروة حيث ظهرت أولى البؤر في ولايتي أدرار و بشار.

لهذا الغرض يتوجب على منتجي التمور الذين لاحظوا أولى الإصابات بالبوفروة، التدخل فورا عن طريق رش مييدات عنكبوتية مخصصة.

بالنسبة لمزارع النخيل الغير مصابة، يتوجب على منتجي التمور أخذ الحيطة و الحذرو ذلك من خلال مراقبة عراجين التمور، لإتخاذ التدابير اللازمة و المعالجة في حالة ظهور أولى البثر.



ينصح بالصيانة الجيدة لبساتين النخيل قبل المعالجة و ذلك بالتخلص من بقايا النخيل و كذا بقايا محصول السنة السابقة