



التنبيهات الزراعية

البوفروة على أشجار النخيل

2025/06/11



تتواجد أشجار النخيل في المناطق الجنوبية ذات الأصناف المبكرة في طور " نهاية العقد الى تضخم الثمار" طور قابل للإصابة بالبوفروة حيث قد تظهر أولى البؤر في الولايات المبكرة (بشار، بني عباس، ان صالح، تمنراست، اليزي، أدرار و تيميمون).

لهذا الغرض، يرجى من منتجي التمور أخذ الحيطة و الحذر و ذلك من خلال مراقبة عراجين التمور، لأخذ التدابير اللازمة و المعالجة في حالة ظهور أولى البؤر.



12, نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر

الهاتف : 023.82.88.86

الفاكس : 023.82.88.96

الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz



Boufaroua sur palmier dattier

11/06/2025

Le stade végétatif du palmier dattier dans les régions phoenicicoles précoces est « **fin nouaison à grossissement des fruits** », stades réceptifs aux attaques des acariens Boufaroua dont les premiers foyers peuvent être signalés dans les wilayas précoces (Béchar, Beni Abbas, In Salah, Tamanrasset, Illizi, Adrar et Timimoune).



A cet effet, nous conseillons les phoeniciculteurs de rester vigilants en surveillant de près leurs palmeraies afin de se préparer à une éventuelle intervention par des traitements chimiques dès l'apparition des premiers foyers.

12, Avenue des Frères Ouadek Hacene Badi El Harrach Alger

Tél: 023 82 88 86

Fax: 023 82 88 96

Site web www.inpv.edu.dz