



نداء للمعالجة

البوفروة على أشجار النخيل

2025/06/23

سجلت شبكة المراقبة الوطنية التابعة للمعهد الوطني اولى بؤر البوفروة او عنكبوت التمر على أشجار النخيل في كل من ولايتي تقرت و بسكرة و التي تتواجد في طور " نمو و تضخم الثمار" طور حساس للإصابة بالبوفروة و المتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة و هبوب رياح في الاسبوع الماضي .

لهذا الغرض، يتوجب على منتجي التمور الذين لاحظوا تواجد هذا العنكبوت، التدخل باحدالمبيدات العنكبوتية المرخصة و المدونة في الجدول، اما بالنسبة لباقي منتجي التمور يرجى مراقبة عراجين التمور، لأخذ التدابير اللازمة و المعالجة في حالة ظهور أولى البؤر.

12, نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر

الهاتف : 023.82.88.86

الفاكس : 023.82.88.96

الموقع الالكتروني www.inpv.edu.dz



Avis de traitement

Boufaroua sur palmier dattier

11/06/2025

Le réseau de surveillance national de l'INPV a décelé les premiers foyers du boufaroua sur palmier dattier au niveau des wilayas de Tougourt et de Biskra où le palmier est au stade « **développement et grossissement des fruits** », stades sensibles aux attaques de l'acarien qui ont coïncidé avec les températures élevées et les vents au cours de la semaine écoulée.



A cet effet, il est préconisé aux phoeniculteurs ayant observé les attaques de cet acarien d'intervenir par l'un des acaricides homologués mentionnés dans le tableau, alors que pour les autres phoeniculteurs la vigilance et la surveillance des régimes des dattes est conseillée afin d'intervention par des traitements homologués dès l'apparition des premiers foyers.

12, Avenue des Frères Ouadek Hacene Badi El Harrach Alger

Tél: 023 82 88 86

Fax: 023 82 88 96

Site web www.inpv.edu.dz

قائمة المبيدات المرخصة ضد افة البوفروة علة اشجار النخيل:

Liste des produits acaricides homologués contre le boufaroua du palmier dattier

Nom commercial du produit	Matière active	Dose d'utilisation	DAR
BIOAZA 32	AZADIRECHTINE 32 G/L	25-150 ml/hl	3 jours
SOMECTIN 1,8 EC	ABAMECTINE EC	40 - 50 ml /hl	14 jours
VAPCOMIC	ABAMECTINE 1.8% EC	50 ml /hl	10 jours
VERTIMEC®	ABAMECTINE EC	75 ml /hl	14 jours
ZELTIMEC 1,8 EC	ABAMECTINE EC	50 ml /hl	/
ZORO TM	ABAMECTINE 1,8 EC	50 ml /hl	/
VERTIN 1,8 %EC	ABAMECTINE18G/L EC	50 à 75 ml/hl	14 jours

®: Produit toxique pour les organismes aquatiques, les abeilles et les insectes pollinisateurs ; Eviter les traitements près des plans d'eau et en période de floraison.

مستخرج من فهرس مبيدات الصحة النباتية للاستخدام الزراعي طبعة 2017 + قائمة المبيدات المضافة 2021
Extrait de l'index des produits phytosanitaires à usage agricole Edition 2017+ la liste additive 2021